

Analysis Aufgabengruppe 2

1 $f(x) = \frac{4}{1+e^x}$

a) Nullstelle

Ein Bruch ist nur dann null, wenn sein Zähler null ist. Dieser ist hier immer 4.

Daher hat f keine Nullstelle.


$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{\underbrace{1+e^x}_{\rightarrow 0}} = \underline{\underline{4}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\underbrace{1+e^x}_{\rightarrow \infty}} = \underbrace{\frac{4}{\infty}}_0 = \underline{\underline{0}}$$

Hinweis: Die Begründung ist hier entbehrlich. Ebenso gut kann man die Grenzwerte aus dem Graphen ablesen (auch ohne Begründung).

b) Mittlere Steigung (= mittlere Änderungsrate)

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{4}{1+e^1} - \frac{4}{1+e^{-1}}}{1 - (-1)} \approx \underline{\underline{-0,92}}$$



$$\underline{\underline{m_w = -1}}$$


c) $f'(-x) = f'(x)$

Der Graph der Ableitung ist achsensymmetrisch zur y-Achse.

Außerdem gilt: $f'(0) = -1$ (vgl. b)

Dort liegt ein TIP der Ableitung vor, da f an der Stelle einen Wendepunkt hat (stärkstes Gefälle).

Wegen der waagrechten Asymptote des Graphen von f für sehr große x , ist die x -Achse auch Asymptote des Graphen der Ableitung.



d) $F(x) = 4x - 4 \cdot \ln(e^x + 1)$

$$F'(x) = 4 - 4 \cdot \frac{1}{e^x + 1} \cdot e^x = 4 - \frac{4e^x}{e^x + 1} = \frac{4(e^x + 1) - 4e^x}{e^x + 1} = \frac{4}{e^x + 1} = f(x)$$

F ist somit Stammfunktion von f .

- e) Da f die 1. Ableitung von F ist und diese stets positiv ist, ist der Graph von F streng monoton steigend. Die 2. Ableitung von F (f') ist immer negativ (vgl. c). Daher ist der Graph von F immer rechtsgekrümmt und hat somit für große x eine waagrechte Asymptote.


Für große x gilt näherungsweise:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 4x - 4 \cdot \ln(e^x + 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} 4x - 4 \cdot \ln(e^x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 4x - 4 \cdot x \cdot \underbrace{\ln(e)}_{=1} = \lim_{x \rightarrow \infty} 0 = 0$$

Die x -Achse ist also waagrechte Asymptote von F für große x .

Der Graph von F läuft daher stets unterhalb der x -Achse. Die Aussage ist also **wahr**.

f) Wegen der Symmetrie zum Wendepunkt ergibt sich z.B. für $k = 2$ folgendes Bild:



Der Wert des Integrals $\int_{-2}^2 f(x)dx$ beträgt genau die Hälfte der Fläche des Rechtecks mit den Seitenlängen 4 und 4, also 8.

Für $k = 1$ hat das Rechteck die Seitenlängen 2 und 4 und somit die Fläche 8. Das Integral hat entsprechend den Wert 4.

Allgemein hat das Integral den Wert $4k$.

2 $w_{a,b,c}(x) = \frac{a}{b + e^{cx}}$

a) $c = 0$: $w_{a,b,0}(x) = \frac{a}{b + e^0} = \frac{a}{b + 1}$

Dieser Wert ist konstant. Der Graph ist somit eine waagrechte Gerade und damit gehört Graph I zu $c = 0$.

$c = 1$: $\lim_{x \rightarrow \infty} w_{a,b,1}(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{\underbrace{b + e^x}_{\rightarrow \infty}} = \frac{a}{\infty} = 0$

Zu $c = 1$ gehört daher Graph II.

Für den Fall $c = -1$ bleibt somit Graph III.

b) $w(x) = \frac{40}{1 + e^{-0,2x}}$

$w(0) = \frac{40}{1 + e^0} = \frac{40}{2} = 20$

Es wurden 20 Seeadler angesiedelt.

$w(x) = 32$: $\frac{40}{1 + e^{-0,2x}} = 32 \Rightarrow 40 = 32(1 + e^{-0,2x}) \Rightarrow 1 + e^{-0,2x} = \frac{40}{32}$
 $\Rightarrow e^{-0,2x} = 0,25 \Rightarrow -0,2x = \ln 0,25 \Rightarrow x = \frac{\ln 0,25}{-0,2} = 6,93147...$

Nach knapp sieben Jahren ist die Anzahl der Seeadler auf 32 angewachsen.

- c) Die Tangente lässt sich aus der gegebenen Steigung und dem Punkt (0/20) (vgl. b) leicht aufstellen durch Einsetzen in die allg. Geradengleichung:
 $20 = 2 \cdot 0 + t \Rightarrow t = 20 \Rightarrow t(x) = 2x + 20$

$t(4) = 2 \cdot 4 + 20 = 28$

$w(4) = \frac{40}{1 + e^{-0,2 \cdot 4}} = \frac{40}{1 + e^{-0,8}} = 27,5989...$

Bei beiden Graphen ergibt sich zum Zeitpunkt vier Jahre nach Ansiedlung in etwa der gleiche Wert.

- d) (1) $\frac{a}{b+1} = 20 \Leftarrow \frac{a}{b+e^0} = 20$: Es wurden 20 Seeadler neu angesiedelt.

- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{b + e^{cx}} = 45$: Auf lange Sicht werden 45 Seeadler auf der Inselgruppe leben.

- (3) $\frac{a}{b + e^{15c}} = 35$: Nach 15 Jahren leben 35 Seeadler auf der Inselgruppe.

- e) Wegen 2a) hat der Graph in etwa den Verlauf von Abb. III (negatives c).
Die waagrechte Asymptote liegt wegen (2) bei 45.

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{b + \underbrace{e^{cx}}_{\rightarrow 0}} = 45 \Rightarrow \frac{a}{b} = 45 \Rightarrow a = 45b \quad (2')$$

$$\text{in (1): } \frac{45b}{b+1} = 20 \Rightarrow 45b = 20b + 20 \Rightarrow 25b = 20 \Rightarrow \underline{\underline{b = 0,8}}$$

$$\text{in (2)': } a = 45 \cdot 0,8 \Rightarrow \underline{\underline{a = 36}}$$